



BAY ANESTHESIA GROUP

THE CARE YOU NEED, WHERE YOU NEED IT

Ph: 650-282-4171
Fax: 650-282-4187
info@bayanesthesiagroup.com
www.bay-anesthesia.com

Pediátrica

Por favor lea las siguientes instrucciones sobre el cuidado de la anestesia. Cumplimiento con cuidado a estas instrucciones nos permitirá proporcionar el cuidado más seguro posible.

Pasos necesarios

1. Llene un formulario de historial médico confidencial. Esta información nos permite desarrollar un plan que es el más apropiado para sus necesidades. Incluso si usted todavía tiene preguntas con respecto a la anestesia, seremos capaces de responder mejor a sus preguntas con esta información. El formulario puede encontrarse en la pestaña 'pagos y formas' en nuestra página web. Su consultorio dental también puede proporcionar una copia impresa.
2. Devolver el formulario de historial médico confidencial para nosotros. Puedes darle la forma a su consultorio dental, o usted puede también enviarnos info@bayanesthesiagroup.com o por fax directamente. Si ya realizo una entrevista telefónica con nosotros, usted puede traer el formulario a su cita.
3. Revise el consentimiento para el tratamiento. También puede elegir firmar y nos devuelva el formulario con sus antecedentes de salud, o usted puede firmar el día del tratamiento.
4. Confirme su cita con nosotros. Se comunicará dentro de dos días a partir de cuando el consultorio dental nos ha informado que necesite servicios de anestesia. En este momento vamos a realizar una entrevista telefónica para recolectar información importante y revisar los detalles sobre el cuidado de la anestesia. Es imperativo que nosotros seamos capaces de llevar a cabo esta entrevista telefónica antes del día de tratamiento para garantizar su seguridad. Póngase en contacto con nuestra oficina si no recibió una llamada de teléfono de nosotros.

Otra información importante

Lea el formulario adjunto pre anestesia instrucciones y siga las instrucciones explícitamente. Violación de cualquiera de estas instrucciones y otras instrucciones específicas de su anesestesiólogo puede resultar en la cancelación de su nombramiento y confiscación de su depósito.

Por favor llegue puntualmente el día de su procedimiento. Llevará a cabo un examen físico completo que consiste en el examen de las vías respiratorias, escuchar corazón y sonidos pulmonares y evaluación general. Es importante tener suficiente tiempo para completar este examen de pre anestesia.

Estamos aquí para proporcionar una experiencia cómoda antes, durante y después del tratamiento. Estas reglas e instrucciones se ponen en práctica con su seguridad y bienestar en mente. Por favor no dude en contactarnos con cualquier pregunta o preocupación que tenga.

Instrucciones de pre-anestesia

Estas instrucciones están diseñadas para su comodidad y protección. Descuidar cualquier de lo siguiente puede conducir a su caso ser pospuesta o cancelada.

Comer y beber: No coma ni beba nada durante ocho 8 horas antes de su cita programada. Si usted necesita tomar medicación, tomarlo con agua por lo menos dos 2 horas antes del tratamiento. Usted puede administrarse instrucciones más específicas por su anesthesiólogo.

Medicamentos: los medicamentos deben tomarse como normalmente a menos que el doctor te advierta de lo contrario y puede tomarse con un pequeño sorbo de agua.

Escolta: todos los pacientes que serán sedados y anestesiados deberán ser acompañados y estar bajo la designación de un adulto responsable. El adulto responsable debe permanecer en la oficina durante la cita menos que sea autorizado por el médico. El paciente debe ser llevado a casa por el adulto responsable (transporte público o taxis son inaceptables).

Ropa y maquillaje: ropa casual y cómoda, con mangas cortas y en dos piezas, se recomienda para la colocación más fácil y más eficaz de los monitores. Lentes de contacto deben eliminarse antes de la cita. Perforaciones faciales también deben eliminarse antes de la cirugía. No use esmalte de uñas o crema humectante en su tronco y los brazos en el día de la cita. Para los niños, se recomienda un cambio de ropa.

Cambio en la salud: un cambio en su salud, especialmente el desarrollo de un resfrío o fiebre, es muy importante. Para su seguridad, usted puede ser designado de nuevo para otro día. Por favor informe al doctor sobre cualquier cambio en su estado de salud antes de su cita.

Después de la cirugía y la anestesia, por favor esté preparado para tener un cuidador adulto responsable para el resto del día. Descansar en casa y evitar tareas peligrosas, conducción, decisiones importantes y por lo menos espere 24 horas antes de volver al trabajo.

Preguntas o inquietudes: Si tus preguntas son sobre el cuidado dental, por favor llame a su dentista.

Dr. Philip Yen (408)823-0944

Dr. Andrew Young (909) 538-9101

Instrucciones post operatorios

Para pacientes pediátricos u hijos que han sido sometidos a anestesia general además de los procedimientos dentales hoy. Por favor, lea y siga las instrucciones a continuación para el resto del día para maximizar la seguridad de su hijo.

1. No deje a su niño solo, ni siquiera por un momento, para los próximos 6 a 8 horas. El medicamento que su hijo ha recibido hoy puede seguir teniendo efectos duraderos que pueden variar durante este periodo de tiempo. Aunque su hijo ha cumplido con criterios de descarga adecuada antes de salir de la oficina dental, de vez en cuando factores tales como la ingesta de alimentos, cambios en la estimulación del medio ambiente, resolución del dolor y otros factores pueden causar que su niño sea un poco soñoliento o descoordinado. Ver a su hijo a menudo si se queda dormido. Es normal que un niño quiere descansar durante el resto del día, sin embargo, es importante estar más atentos que la posición de la cabeza de su hijo facilite la respiración. Esto significa que la barbilla de su hijo no deba ser bajado en el pecho, como esto puede obstruir las vías respiratorias.
2. No permita que su hijo participe en físicamente exigentes actividades (deportes, etc.). Aunque su hijo puede parecer estar totalmente despierto y alerta y solicite participar en tales actividades, la coordinación y la capacidad de reaccionar a responder durante la actividad física pueden continuar siendo deterioradas y conducir a lesiones no intencionales.
3. Se recomienda claro líquidos están dadas u ofreció tan pronto como sea posible mientras su hijo pide y lo tolera. Otros líquidos y alimentos deben ser avanzados como el niño lo tolera. A veces su niño puede vomitar o tener náuseas como alimento y el líquido se dan – por esta razón es importante comenzar a líquidos claros primero para asegurarse de que pueden tolerar el siguiente nivel de consumo. Anime a su hijo que ingesta mucho líquido lo más posible durante todo el día ya que esto ayudará a su hijo recuperarse de los medicamentos que él o ella han recibido. Es importante que su hijo no se deshidrate. Los efectos duraderos de los medicamentos combinados con un estado de deshidratación es una situación peligrosa.
4. Estrategias para controlar el dolor habrá sido discutidos antes de la descarga. Es importante que siga estas instrucciones cuidadosamente. Por lo general, en el mostrador paracetamol (tylenol) o ibuprofeno (motrin, advil) están bien consumir como indique las recomendaciones del fabricante según sea necesario para el dolor.
5. Mientras la boca de su niño está todavía adormecida de la anestesia local no debería darle bebidas calientes o alimentos duros. Asimismo, tenga cuidado que no se muerda en las mejillas, labios/lengua o alrededor de la boca. El paciente no puede sentir que él o ella esta traumatizando los tejidos de la boca y puede desarrollar una úlcera. El entumecimiento generalmente dura 3-4 horas.

Por favor llame a nuestro número de 24 horas si observan alguna de las siguientes:

1. Su hijo todavía aparece somnolencia y letargo y 'no este normal' después de 6 horas
2. Persistentes de náuseas o vómitos (una o dos veces el vómito es normal, pero extendidas episodios de vómitos no es normal)
3. Su hijo comienza a comportarse extrañamente

4. Hay sangrado persistente, excesiva
5. El niño desarrolla una fiebre alta (por encima de 100 grados f) o erupción
6. Su hijo sigue experimentando un dolor que no se alivia por sobre los medicamentos de mostrador

Llame inmediatamente al 911 si observa lo siguiente:

1. su hijo es incapaz de ser despertado – no responde o no va a seguir órdenes
2. el niño tiene dificultad para respirar
3. su hijo tiene una convulsión
4. Si usted está preocupado por la seguridad de su hijo inminente nuestros números de 24 horas se enumeran. No dude en llamar si tiene alguna pregunta con respecto a la seguridad de su hijo.

Dr. Philip Yen (408)823-0944

Dr. Andrew Young (909) 538-9101